

Srbija

Published on Syngenta (<http://www.syngenta.rs>)

[Naslovnica](#) > Cherokee 487,5 SE

Cherokee 487,5 SE



Cherokee 487,5 SE

Last updated:

23.04.2018

Fungicid

Pack size:

4 x 5 l

Aktivna materija:

375 g/l

Hlorotalonil

62.5 g/l

Propikonazol

50 g/l

Ciprokonazol

Način delovanja:

Suspoemulzija (SE)

Trostruka snaga za veći prinos

Video of Syngenta - Fungicid
Cherokee

Video of Syngenta - Fungicid
Cherokee

Cherokee 487,5 SE je sistemski i kontaktni fungicid sa preventivnim delovanjem koji se primenjuje u usevu pšenice za suzbijanje bolesti lista i klasa, i to prouzrokovana sive pegavosti lista (*Septoria tritici.*), rđe (*Puccinia spp.*), pepelnice (*Blumeria graminis f.sp. tritici.*). Primenjuje se u količini od 1,5 do 2 l/ha, uz utrošak vode 200 - 400 l/ha. Pri količini primene od 2 l/ha smanjuje zarazu klasa patogenima roda Fusarium.

Pri upotrebi doze od 1,5 l/ha, vreme primene je prema preporuci prognozno-izveštajne službe ili najkasnije pri pojavi prvih simptoma bolesti, u fazi razvoja pšenice BBCH 31-32 (prvo kolence najmanje 1 cm iznad kolence bokorenja, drugo kolence najmanje 1 cm iznad prvog kolence).

Pri upotrebi doze od 2 l/ha, vreme primene je prema preporuci prognozno-izveštajne službe ili najkasnije pri pojavi prvih simptoma bolesti, u fazi razvoja pšenice:

- tokom vlatanja, klasanja i cvetanja, po pojavi simptoma oboljenja, a pre početka širenja parazita na gornja tri lista uključujući zastavičar i klas, za suzbijanje pepelnice (*Blumeriela graminis*) i rđe lista (*Puccinia spp.*);
- tokom vegetacije, po pojavi simptoma i postojanja uslova za širenje parazita za suzbijanje prouzrokovača sive pegavosti lista (*Septoria spp.*);
- u fazi kraja klasanja (po pojavi svih klasova i početkom cvetanja (faza 59-61 BBCH skale) za suzbijanje paleži klasa (*Fusarium spp.*).

Cherokee 487,5 SE se može na istoj površini primeniti najviše dva puta u toku godine, uključujući i alternativnu primenu drugih fungicida iz grupe triazola i sličnih jedinjenja istog mehanizma delovanja (inhibitori sinteze ergosterola), odnosno fungicida čije aktivne materije pripadaju grupi 3 prema FRAC.

Karenca

49 dana za pšenicu.

Usev/Zasad	Količina primene	Vreme primene	Utrošak vode	Napomena
Pšenica	1,5-2 l/ha	Tokom vlatanja, klasanja i cvetanja po pojavi prvih simptoma za suzbijanje pepelnice, rđe, sive pegavosti lista i klasa, a pre sticanja uslova za širenje oboljenja. Primenom na kraju klasanja i početkom cvetanja smanjuje pojavu paleži klasa (<i>Fusarium spp.</i>)	200-400 l/ha	Može se primeniti najviše dva puta u toku godine na istoj površini