

Srbija

Published on Syngenta (<https://www.syngenta.rs>)

[Naslovna](#) > Quadris

Quadris



Quadris

Last updated:

03.08.2021

Fungicid

Sredstvo za zaštitu bilja

Aktivna materija:

250 g/l

Azoksistrobin

Formulacija:

Koncentrovana suspenzija (SC)



Kvalitet koji traje

QUADRIS je sistemski fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem. Primenjuje se za suzbijanje prouzrokovaca plamenjače (*Plasmopara viticola*) i pepelnice (*Uncinula necator*) vinove loze, plamenjače (*Phytophthora infestans*) i crne pegavosti (*Alternaria solani*) paradajza i krompira, plamenjače krastavca (*Pseudoperonospora cubensis*), pepelnice (*Erysiphe heraclei*) i crne pegavosti (*Alternaria dauci*) mrkve, pegavosti lista cvekle (*Cercospora* spp.), sušenja lastara maline (*Dydimella applanata*) i sive pegavosti lista jagode (*Mycosphaerella fargariae*). Sporedno deluje na truleži i pepelnice.

Način delovanja:

Aktivna materija **azoksistrobin** se odlikuje lokalsistemskim delovanjem, što joj omogućava ravnomerno raspoređivanje u biljnom tkivu nakon tretmana. Deluje inhibitorno na proces ćelijskog disanja patogena, sprečavajući tako sporulaciju i formiranje plodonosnih tela.

Primena:

Usev	Patogeni koje suzbija	Količina primene	Vreme primene	Karenca
Vinova loza	Plamenjača (<i>Plasmopara viticola</i>), pepelnica (<i>Uncinula necator</i>)	0,75 l/ha	Tokom vegetacije preventivno ili po sticanju uslova za pojavu i razvoj oboljenja.	21 dan
Malina	Sušenje lastara (<i>Dydimella applanata</i>)	0,75 l/ha	Preventivno, od faze kada su prvi lastari dužine oko 60 cm i kada se očekuju povoljni uslovi za zaražavanje i širenje oboljenja.	10 dana
Jagoda	Siva pegavost lista (<i>Mycosphaerella fargariae</i>)	0,75-1 l/ha	Preventivno, do početka zrenja i nakon berbe.	3 dana
Krompir	Plamenjača (<i>Phytophthora infestans</i>), crna pegavost (<i>Alternaria solani</i>)	0,75 l/ha	Preventivno, pred sticanje uslova za zaražavanje, najkasnije u vreme pojave prvih simptoma, kada postoje ili se očekuju povoljni uslovi za širenje oboljenja.	14 dana

Paradajz	Plamenjača (<i>Phytophthora infestans</i>), crna pegavost (<i>Alternaria solani</i>)	0,75 l/ha	Preventivno, pred sticanje uslova za zaražavanje, najkasnije u vreme pojave prvih simptoma, kada postoje ili se očekuju povoljni uslovi za širenje oboljenja.	3 dana
Krastavac	Plamenjača (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	0,75 l/ha	Preventivno, od faze 2 prava lista, u zavisnosti od vremenskih uslova i prisustva inokuluma u intervalima 8-10 dana.	4 dana
Mrkva	Crna pegavost lista (<i>Alternaria dauci</i>), pepelnica (<i>Erysiphe heraclei</i>)	1 l/ha	U fazi prvi pravi list razvijen do završen rast – postignuta forma i veličina korena.	7 dana
Cvekla	Pegavost lista (<i>Cercospora</i> spp.)	1 l/ha	Po pojavi prvih simptoma	14 dana

Mogućnost mešanja:

Može se mešati sa većinom insekticida i fungicida. Pre upotrebe proveriti kompatibilnost sa drugim preparatima. Preparat se primenjuje prskanjem ili orošavanjem svim uređajima za tretiranje sa zemlje.
