

Srbija

Published on Syngenta (<https://www.syngenta.rs>)

[Naslovna](#) > Amistar Plus

Amistar Plus



Amistar Plus

Last updated:

02.03.2021

Fungicid

Sredstvo za zaštitu bilja

Registracioni broj:

A18253A

Aktivna materija:

125g/l

Azoksistrobin

125g/l

Difenokonazol

Formulacija:

Koncentrovana suspenzija (SC)

Više od fungicida

AMISTAR® PLUS je preventivni i kurativni fungicid za suzbijanje bolesti u usevu suncokreta i uljane repice. Primenjuje se za suzbijanje prouzrokovaca bele truleži (*Sclerotinia sclerotiorum*), crne pegavosti stabljike (*Phoma macdonaldi*) i sivomrke pegavosti (*Phomopsis helianthi*) u usevu suncokreta, kao i suve truleži (*Phoma lingam*) i bele truleži (*Sclerotinia sclerotiorum*) u usevu uljane repice. Preporučena količina primene je 1 l/ha.




Način delovanja:

AMISTAR® PLUS sadri dve aktivne materije (difenkonazol, azoksistrobin) različitog mehanizma delovanja, što je preduslov za izbegavanje ukrštene rezistentnosti. **Difenkonazol** je aktivna materija iz grupe triazola, koja osim preventivnog delovanja na površini biljnih delova, pokazuje i izraženo kurativno delovanje pa može da zaustavi već postojeće zaraze i daljnje širenje oboljenja.

Azoksistrobin je aktivna materija iz grupe strobilurina (Qol) sa vrlo širokim spektrom delovanja. Inhibira ćelijsko disanje (respiraciju), usled čega se zaustavlja klijanje spora, sprečava rast micelije i sporulacija.

Osim fungicidnog delovanja, AMISTAR® PLUS poseduje biostimulativni efekat koji omogućava biljkama da se lakše adaptiraju na stresne uslove. Pozitivan efekat na produžetak vegetacije pozitivno utiče na povećanje prinosa čak i u odsustvu bolesti!



Primena:

Usev	Patogeni koje suzbija	Količina primene	Vreme primene	Karenca
Suncokret	Bela trulež (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>), crna pegavost stabljike (<i>Phoma macdonaldi</i>), sivomrka pegavost (<i>Phomopsis helianthi</i>)	1 l/ha	Od izduživanja stabljike do kraja butonizacije	60 dana
Uljana repica	Suva trulež (<i>Phoma lingam</i>), bela trulež (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	1 l/ha	Od faze 4 lista do sredine ili do kraja cvetanja	*OVP

*OVP - Obezbeđena vremenom primene

U suncokretu se primenjuje dva puta tokom vegetacije, uz razmak od 21 dan, dok se u uljanoj repici jednom primenjuje u jesen i jednom u proleće.

Mogućnost mešanja:

AMISTAR® PLUS se može mešati sa većim brojem drugih fungicida i insekticida, ali prethodno proveriti kompatibilnost. Ne sme se mešati sa preparatima koji sadrže ulje.
