

Srbija

Published on Syngenta (<https://www.syngenta.rs>)

[Naslovna](#) > Cidely Top

Cidely Top



Cidely Top

Last updated:

02.11.2020

Fungicid

Sredstvo za zaštitu bilja

Aktivna materija:

125 g/l

Difenokonazol

15 g/l

Ciflufenamid

Formulacija:

Koncentrat za disperziju (DC)

Pouzdan partner

CYDELI® TOP je sistemski fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem, za suzbijanje prouzrokovaca pepelnice, crne pegavosti lista, antraknoze i krastavosti plodova u povrtarstvu i voćarstvu.





Način delovanja:

CYDELI® Top je folijarni fungicid koji sadrži dve aktivne materije, **difenkonazol** koji pripada grupi triazola i **ciflufenamid** nepoznatog mehanizma delovanja. **Difenkonazol** je aktivna materija koja osim preventivnog delovanja na površini biljnih delova, pokazuje i izraženo kurativno delovanje pa može da zaustavi već postojeće zaraze i dalje širenje oboljenja. **Ciflufenamid** je aktivna materija iz grupe fenilacetamida. U biljci se širi translaminarno, a uz dodatno delovanje gasnom fazom doprinosi homogenoj distribuciji **CYDELI® TOP**-a po biljnim delovima do kojih kapi rastvora preparata ne mogu dospeti. Odlikuje se preventivnim i kurativnim delovanjem.

CYDELI® Top zbog jedinstvenog načina delovanja može da zaustavi razvoj patogena u različitim fazama razvoja. **CYDELI® TOP** primenjen preventivno sprečava formiranje haustorija i razvoj micelije, a u kasnijoj fazi sprečava sporulaciju gljive.

Primena:

Usev	Patogeni koje suzbija	Količina primene	Vreme primene	Karenca
-------------	------------------------------	-------------------------	----------------------	----------------

Jagoda , u zatvorenom i na otvorenom prostoru	Pepelnice (<i>Sphaerotheca macularis</i> , <i>Podosphaera macularis</i>), antraknoza ploda (<i>Colletotrichum acutatum</i>), siva pegavost lista (<i>Mycosphaerella fragariae</i>), crna pegavost lista (<i>Alternaria</i> spp.)	100 ml/1000 m ² (100 ml/100 l vode)		3 dana
Paradajz , u zatvorenom i na otvorenom prostoru	Crna pegavost lista (<i>Alternaria solani</i>), plesnivost lista (<i>Fulvia fulva</i>)	100 ml/1000 m ² (100 ml/100 l vode)	Preventivno ili najkasnije po pojavi prvih simptoma, od faze formiranja sporednih stabala do pune zrelosti plodova.	3 dana
Paprika, plavi patlidžan u zatvorenom prostoru	Pepelnice (<i>Leveillula taurica</i> , <i>Erysiphe lycopersici</i> , <i>Oidium lycopersici</i>), crna pegavost lista (<i>Alternaria solani</i>)	100 ml/1000 m ² (100 ml/100 l vode)		3 dana
Dinja, lubenica, krastavac i tikvica u zatvorenom prostoru	Pepelnice (<i>Erysiphe cichoracearum</i> , <i>Sphaerotheca fuliginea</i> , <i>Golovinomyces cichoracearum</i>), crna pegavost lista (<i>Alternaria cucumerina</i>), gumozna plamenjača stabla (<i>Didymella bryoniae</i>), krastavost plodova (<i>Cladosporium cucumerinum</i>)	100 ml/1000 m ² (100 ml/100 l vode)		3 dana

Posebne napomene:

CYDELI® TOP je u skladu sa programima integralnog upravljanja štetnim organizmima (IPM). Nije štetan za korisne insekte koji se koriste u staklenicima, kada se koristi u skladu sa uputstvom za primenu. **CYDELI® TOP** se na istoj površini, u toku jedne godine, može primeniti najviše dva puta u dinjama, lubenicama, krastavcu, tikvicama, paprici i plavom patlidžanu, dok se u jagodama i paradjzu može primeniti jednom u polju, a dva puta u zatvorenom prostoru. Interval između dva tretiranja je 10 dana.
