

Ortiva Top



Ortiva Top

Last updated:
06.03.2021

Fungicid

Sredstvo za zaštitu bilja

Aktivna materija:

200 g/l

Azoksistrobin

125 g/l

Difenokonazol

Formulacija:

Koncentrovana suspenzija (SC)

Da povrće dobro vradi!

ORTIVA® Top je sistemični fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovaca pepelnica (*Leveillula taurica*, *Erysiphe cichoracearum*, *Sphaerotheca fuliginea*, *Podosphaera* spp.), krastavosti plodova (*Cladosporium cucumerinum*) i crne pegavosti (*Alternaria* spp.) u povrću.



Način delovanja:

ORTIVA® Top je sistemični fungicid koji sadrži dve aktivne materije, difenokonazol iz grupe triazola i azoksistrobin iz grupe strobilurina (QoI), čijom se zajedničkom primenom povećava efikasnost na biljne bolesti. **Azoksistrobin** inhibira respiraciju i sprečava klijanje spora, razvoj micelije i stvaranje spora. Zahvaljujući svom translaminarnom kretanju kroz sprovodne sudove pruža maksimalnu zaštitu svih biljnih delova koji nisu direktno izloženi fungicidu tokom primene. **Difenokonazol** je aktivna materija širokog spektra delovanja iz hemijske grupe triazola, koji inhibiraju sintezu ergosterola gljiva. Poseduje translaminarno delovanje, tj. kreće se kroz list tretirane biljke sa njegovog lica ka naličju i obratno. Osim kontaktnog delovanja, difenkonazol pokazuje i izraženo kurativno delovanje tako što zaustavlja već postojeće zaraze i sprečava dalje širenje infekcije.

Primena:

Usev	Patogeni koje suzbija	Količina primene	Vreme primene	Karenca
Krastavac u zaštićenom prostoru i tikvice u zaštićenom i na otvorenom	Pepelnice (<i>Erysiphe cichoracearum</i> , <i>Sphaerotheca fuliginea</i>)	1 l/ha	Preventivno ili najkasnije po pojavi prvih simptoma, od kraja faze izduživanja glavnog stabla do punе zrelosti plodova.	3 dana
Dinja u zaštićenom prostoru	Pepelnice (<i>Erysiphe cichoracearum</i> , <i>Sphaerotheca fuliginea</i>), krastavost plodova (<i>Cladosporium cucumerinum</i>)	1 l/ha	Preventivno ili najkasnije po pojavi prvih simptoma, od kraja faze izduživanja glavnog stabla do punе zrelosti plodova.	3 dana
Paradajz u zaštićenom prostoru	Pepelnica (<i>Leveillula taurica</i>), crna pegavost (<i>Alternaria spp.</i>)	1 l/ha	Preventivno ili najkasnije po pojavi prvih simptoma, od kraja faze izduživanja glavnog stabla do faze kada 70% plodova pokazuje tipičnu boju zrelog ploda.	3 dana
Paprika, plavi patlidžan u zaštićenom prostoru	Pepelnica (<i>Leveillula taurica</i>)	1 l/ha	Preventivno ili najkasnije po pojavi prvih simptoma, od kraja faze izduživanja glavnog stabla do faze kada 70% plodova pokazuje tipičnu boju zrelog ploda.	3 dana
Jagoda u zaštićenom prostoru	Pepelnica (<i>Podosphaera spp.</i>)	1 l/ha	Preventivno ili najkasnije po pojavi prvih simptoma, od faze cvetanja do druge berbe.	3 dana
*Karfiol, brokoli	Crna pegavost lista (<i>Alternaria spp.</i>)	1 l/ha	Od početka formiranja glavica do pojave prvih zatvorenih cvetova	14 dana
*Praziluk	Crna pegavost lista (<i>Alternaria spp.</i>), rđa (<i>Puccinia allii</i>)	1 l/ha	Od faze kada se listovi zadebljavaju sve dok stabljika ne dostigne normalan prečnik i debljinu.	21 dan
*Grašak	Antraknoza (<i>Ascochyta pisii</i>)	1 l/ha	Od pojave latica sve dok 70% mahuna ne dostigne normalnu veličinu.	14 dana
*Mrkva, celer, peršun, paškanat	Crne pegavost (<i>Alternaria dauci</i>), pepelnica (<i>Erysiphe heraclei</i>), siva pegavost (<i>Septoria apicola</i>)	1 l/ha	Od početka razvoja lista sve dok ne dostignu 80% normalnu veličinu i oblik.	14 dana

*Dinja i lubenica na otvorenom	Pepelnice (<i>Erysiphe cichoracearum</i> , <i>Sphaerotheca fuliginea</i>), krastavost plodova (<i>Cladosporium cucumerinum</i>)	1 l/ha	Od pojave prvog bočnog izdanka do potpunog sazrevanja plodova.	14 dana
*Plavi patlidžan na otvorenom	Pepelnice (<i>Leveillula taurica</i> , <i>Oidium neolyopersici</i>), crna pegavost (<i>Alternaria spp.</i>)	1 l/ha	Od pojave prvog bočnog izdanka sve dok 70% plodova ne dostigne normalnu boju - do sazrevanja.	7 dana
*Zelena salata	Pegavost lista (<i>Alternaria brassicae</i> , <i>Cercospora spp.</i>)	1 l/ha	Od početka razvoja listova dok ne dostignu normalnu veličinu i oblik.	14 dana
*Spanać, endivija, rukola	Pegavost lista (<i>Cercospora spp.</i>)	1 l/ha	Od početka razvoja listova dok ne dostignu normalnu veličinu i oblik	14 dana
*Špargla	Rđa (<i>Puccinia asparagi</i>)	1 l/ha	Kada prestane da se razvija najveći izdanak do starenja dela iznad površine zemlje.	OVP

*U postupku je proširenje registracije na male useve.

Posebne napomene:

Fitotoksičan je za jabuku. Prilikom tretiranja sprečiti zanošenje na susedne zasade jabuke. Koristiti antidrift rasprskivače.

Mogućnost mešanja:

Ne sme se mešati sa sredstvima za zaštitu bilja i sredstvima za ishranu bilja izrazito kisele i izrazito bazne reakcije, kao ni sa regulatorima rasta.
