

Srbija

Published on Syngenta (<https://www.syngenta.rs>)

Naslovna > Casper 55 WG

Casper 55 WG



Casper 55 WG

Last updated:

06.10.2020

Herbicid

Aktivna materija:

500 g/kg

Dikamba

50 g/kg

Prosulfuron

Formulacija:

Vododisperzibilne granule (WG)

Čuvar tvojih prinosa

CASPER® 55 WG je selektivni translokacioni herbicid namenjen suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih korova u usevu kukuruza.



Način delovanja:

CASPER® 55 WG je herbicid koji u sebi sadrži dve aktivne materije, dikambu i prosulfuron, koji se međusobno odlično dopunjuju. **Prosulfuron** pripada hemijskoj grupi sulfonilurea koja ima širok spektar delovanja na jednogodišnje i neke višegodišnje širokolisne korove. Apsorbuje se preko lista i korena. **Dikamba** je dugo godina unazad korišćen i dokazan herbicid izrazito translokacionog delovanja, koji suzbija širok spektar širokolisnih korova. Apsorbuje se preko listova i translocira kroz celu biljku. Obe aktivne materije zaustavljaju rast i razvoj korova, utiču na promenu boje korova i na

kraju dovode do potpunog propadanja korova. Visoka efikasnost u suzbijanju korova postiže se folijarnom primenom, dok ostatak **CASPER® 55 WG** koji dospe na površinu zemljišta obezbeđuje produženo delovanje odnosno sprečava nicanje i dalji razvoj korova.

Primena:

Biljna vrsta	Količina primene	Vreme primene	Karenca
Kukuruz	0,25-0,3 kg/ha	Posle nicanja, kada je kukuruz u fazi 3-5 listova, a korovi od faze nicanja pa do pojave razvijena 2-6 listova.	*OVP – merkantilni kukuruz 14 dana – silažni kukuruz

*OVP – obezbeđena vremenom primene

Spektar delovanja CASPER® 55 WG:

Jednogodišnji širokolisni korovi:

- Lipica teofrastova (*Abutilon theophrasti*)
- Ambrozija (*Ambrosia artemisiifolia*)
- Štir obični (*Amaranthus retroflexus*)
- Obična pepeljuga (*Chenopodium album*)
- Srolisna pepeljuga (*Chenopodium hybridum*)
- Tatula obična (*Datura stramonium*)
- Veliki dvornik (*Polygonum lapathifolium*)
- Obični dvornik (*Polygonum persicaria*)
- Poljska gorušica (*Sinapis arvensis*)
- Pomoćnica obična (*Solanum nigrum*)
- Obična boca (*Xanthium strumarium*)

Posebne napomene:

Ukoliko dođe do preoravanja ili preveremnog skidanja tretiranog kukuruza, četiri meseca posle primene može se ponovo sejati kukuruz. Ne sme se primenjivati u semenskom kukuruзу i kukuruзу za podusevom (pasulj, bundeva i sl.), u kraškim područjima, na vrlo slabo humoznim zemljištima, zbog ispirljivosti.

Mogućnost mešanja:

Može se mešati sa drugim preparatima za folijarno suzbijanje korova u kukuruзу, kao što su preparati za suzbijanje travnih korova iz hemijske grupe sulfonilurea.
