

Srbija

Published on Syngenta (<https://www.syngenta.rs>)

[Naslovna](#) > Ampligo 150 ZC

---

## Ampligo 150 ZC



# Ampligo 150 ZC

Last updated:

02.03.2021

## Insekticid

### Sredstvo za zaštitu bilja

#### Aktivna materija:

100 g/l

Hlorantraniliprol

50 g/l

Lambda cihalotrin

#### Formulacija:

Mešavina koncentrovane suspenzije SC i suspenzije kapsula CS (ZC)

### Dupla moć za pomoć kroz dva mehanizma delovanja!

**AMPLIGO® 150 ZC** je nesistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem za suzbijanje *Lepidoptera* u usevima kukuruza, kukuruza šećerca, paradajza i kupusa.

#### Način delovanja:

**AMPLIGO® 150 ZC** je insekticid na bazi dve aktivne materije, hlorantraniliprola i lambda-cihalotrina.

**Hlorantraniliprol** je ovilarvicidni insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem. Stimuliše otpuštanje kalcijuma iz mišića insekata, što dovodi do paralize i smrti štetočina. **Lambda-cihalotrin** pripada hemijskoj grupi piretroida, koji remete protok natrijumovih jona kroz nervnu membranu insekata. Odlikuje se kontaktnim i digestivnim delovanjem. Kombinacija ove dve aktivne materije omogućava **AMPLIGO® 150 ZC** da deluje na skoro sve razvojne stadijume u životnom ciklusu štetočine.



Orasli



Jaja



Male larve



Velike larve



Lutka

Lamda-cyhalothrin

Brzo delovanje

Chlorantraniliprole

Dugotrajno delovanje

 **Ampligo® 150 ZC**

Ukupno delovanje

**Primena:**

Usev	Štetni organizmi koje suzbija	Količina primene	Vreme primene	Karenca
<b>Kukuruz</b>	Kukuruzni plamenac ( <i>Ostrinia nubilalis</i> )	0,2-0,25 l/ha	Na početku pojave štetočine, u vreme masovnog leta i na kraju leta, od pojave četvrtog kolenceta do voštane zrelosti kukuruza	7 dana
<b>Kukuruz šećerac</b>	Kukuruzni plamenac ( <i>Ostrinia nubilalis</i> ), pamukova sovica ( <i>Helicoverpa armigera</i> )	0,2-0,3 l/ha	U vreme masovnog leta štetočine, najkasnije do kraj razvoja zrna, kad približno sva zrna dostignu krajnju veličinu	7 dana
<b>Paradajz</b>	Pamukova sovica ( <i>Helicoverpa armigera</i> ), moljac paradajza ( <i>Tuta absoluta</i> )	0,4 l/ha	U vreme pojave štetočina, od početka cvetanja do pune zrelosti paradajza	3 dana
<b>Krompir</b>	Krompirova zlatica ( <i>Leptinotarsa decemlineata</i> )	0,3 l/ha	Na početku piljenja larvi i po pojavi prvih larvi L3	14 dana
<b>Kupus</b>	Mali kupusar ( <i>Pieris rapae</i> )	0,1-0,3 l/ha	U vreme početka piljenja gusenica	14 dana

**Posebne napomene:**

Zbog potencijalnog razvoja rezistentnosti, ne primenjivati **AMPLIGO® 150 ZC** više od dva puta

tokom vegetacione sezone u usevu kukuruza, paradajza i kupusa, odnosno jednom u toku vegetacione sezone u usevu kukuruza šećerca. Radi zaštite pčela i drugih oprašivača ne primenjivati u vreme cvetanja useva i u vreme ispaše pčela.

**Mogućnost mešanja:**

**AMPLIGO® 150 ZC** se ne sme mešati sa sredstvima alkalne reakcije.

---