

Srbija

Published on Syngenta (<https://www.syngenta.rs>)

[Naslovna](#) > Fusilade Forte

Fusilade Forte



Fusilade Forte

Last updated:

05.10.2020

Herbicid

Sredstvo za zaštitu bilja

Aktivna materija:

150 g/l

Fluazifop-p-butil

Formulacija:

Koncentrat za emulziju (EC)

Lider protiv divljeg sirka

FUSILADE® Forte je selektivni translokacioni herbicid sa kontaktnim delovanjem, za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova u ratarskim usevima, voću i povrću.



Način delovanja:

FUSILADE® Forte je graminicid sa najvećim brojem registrovanih useva u svetu. Sadrži aktivnu materiju **fluazifop-p-butil** koji inhibira aktivnost enzima acetil-CoA-karboksilaze zaustavljajući proces biosinteze masnih kiselina, zbog čega se zaustavlja porast korova. Usvaja se listom a u biljci se kreće ksilemom i floemom. Nakuplja se u rizomima i stolonama višegodišnjih, kao i u meristemskim tkivima jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova. Simptomi delovanja herbicida su vidljivi nakon par dana, a do potpunog propadanja korova dolazi nakon 14-21 dana. **FUSILADE® FORTE** osim odlične

efikasnosti, poseduje i vrhunsku selektivnost po gajeni usev u kojem se primenjuje.

Primena:

Biljna vrsta	Količina primene	Vreme primene	Karenca
Jabuka		Do početka cvetanja počev od prve godine uzgoja, a	28 dana
Kruška		korovi u intezivnom porastu, faza 3-5 listova	
Dunja			
Krompir	0,8 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova		42 dana
Kupus	1,3 l/ha za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova	Korovi u intezivnom porastu, faza 3-5 listova	49 dana
Luk			49 dana
Šećerna repa	U split aplikaciji 0,6+0,6 l/ha, u intervalu 10-14 za suzbijanje divljeg sirka iz semena i rizoma		70 dana
Soja		Do početka cvetanja kada su korovi u intezivnom porastu, faza 3-5 listova	OVP (obezbeđena vremenom primene)
Suncokret			
Uljana repica		Korovi u intezivnom porastu, faza 3-5 listova, nezavisno od faze razvoja useva	OVP (obezbeđena vremenom primene)

Spektar delovanja FUSILADE® Forte

Jednogodišnji travni korovi:

- Proso korovsko (*Echinochloa crus-galli*)
- Divlji sirak iz semena (*Sorghum halepense*)
- Muhar sivi (*Setaria glauca*)
- Muhar zeleni (*Setaria viridis*)
- Svračica (*Digitaria sanguinalis*)
- Samonikla pšenica (*Triticum aestivum*)

Višegodišnji travni korovi:

- Divlji sirak iz rizoma (*Sorghum halepense*)
- Pirevina obična (*Agropyrum repens*)
- Zubača obična (*Cynodon dactylon*)

Posebne napomene:

Za postizanje pune efikasnosti herbicida **FUSILADE® Forte** u suzbijanju travnih korova moramo voditi računa o određenim uslovima. Prvo, trebamo voditi računa da temperatura prilikom primene bude do 22°C. Takođe, veoma je važno da se tretman obavi u propisanom uzrastu korova (korov visine 15-20 cm). Greške se najčešće javljaju kada čekamo da se na parceli pojavi što više izniklog sirka, a onda ulazimo u period visokih temperatura (preko 25-28°C) pri čemu će efikasnost preparata sasvim sigurno biti umanjena. Osim toga, za bolje suzbijanje višegodišnjih travnih korova preporučuje se međuredna obrada i usitnjavanje rizoma najmanje tri nedelje od primene preparata, jer taman je toliko vremena potrebno preparatu **FUSILADE® FORTE** da se iz listova spusti u rizome i da ih u potpunosti uništi.

Mogućnost mešanja:

Pre mešanja sa drugim preparatima, posebno različitih formulacija proveriti njihovu fizičku kompatibilnost.
