

Prednosti u polju/zasadu

- EVURE® nije opasan i nije otrovan za pčele
- Formulacija ima slab miris i malu količinu primene (jednostavnije rukovanje)
- Izuzetna efikasnost na koju ne utiču visoke temperature i intenzitet sunčeve svetlosti
- Deluje negativno i na razvoj grinja
- Proizvod je selektivan za korisne insekte, kao što su predatorski insekti



EVURE® ima malu toksičnost za korisne insekte - oprašivače, parazite, predatore - pogođeni su samo štetni insekti.



Korisni insekti	Organofosforni insekticidi	Većina sintetičkih piretroida	EVURE®
Trčuljci (<i>Carabidae</i>)			
Pčele i ose			
Paukovi i grinje			
Zlatooka mušica (<i>Chrysopidae</i>)			
Osolika muva (<i>Syrphidae</i>)			
Bubamare (<i>Coccinellidae</i>)			

VELIKA TOKSIČNOST

MALA TOKSIČNOST

 **EVURE®**

syngenta.

Oštar prema štetocinama,
blag prema korisnim insektima



Univerzalni insekticid
za vrhunsko voće,
povrće, uljanu repicu
i pšenicu

 **EVURE®**


syngenta.

SYNGENTA AGRO d.o.o.
Airport City Belgrade
Omladinskih brigada 88b, 11070 Novi Beograd
tel: +381 11 3129981, fax: +381 11 3129980
www.syngenta.rs

Ovaj prospekt je informativnog karaktera i sadži opšte informacije. Pre primene proizvoda obavezno pročitati uputstvo za upotrebu na pakovanju preparata. Proizvođač ne može snositi odgovornost za štetu nastalu nepravilnim rukovanjem ili primenom preparata, kao i usled pojave smanjene osetljivosti ili otpornosti štetnih organizama. Za detaljnije informacije, preporuke i stručnu pomoć obratite se stručnoj službi zastupnika.

Profil proizvoda

EVURE® je novi **Syngenta** insekticid formulisan u obliku ulja u vodi (EV) na bazi tau-fluvalinata. Delujući kontaktno i utrobno, **EVURE**® ima jako delovanje protiv štetočina koje se hrane biljnim tkivom (lisnih vaši, tripsa, cikada, stenica), kao i protiv nekih malih buba i lepidoptera, i odobren je za upotrebu na mnogim voćnim, ratarskim i industrijskim usevima. **EVURE**® karakteriše brza moć suzbijanja štetočina i postojanost u delovanju. Takođe ima dobru otpornost na ispiranje i stabilan pri izloženosti svetlosti i toploti, omogućavajući fleksibilnu primenu proizvoda.




EVURE® ima dobru efikasnost i postojanost delovanja zahvaljujući trećem benzenskom prstenu koji omogućava molekulu tau-fluvalinata da bude manje osetljiv na razgradnju pod uticajem svetlosti i temperature

Do veće selektivnosti **EVURE**® prema korisnim insektima dolazi zahvaljujući prisustvu VALINE u molekulu tau-fluvalinata

Širok spektar:

- Aktivna supstanca tau-fluvalinat pripada grupi sintetičkih analoga piretrina
- **EVURE**® ima kontaktni neuro-paralitički efekat, inhibirajući razvoj grinje
- **EVURE**® pruža vrlo brz početni efekat i dugo delovanje nakon primene

Karakteristike	Prednosti
Široka primena	Registracija u različitim usevima
EW formulacija emulzija ulja u vodi	Odlična mogućnost mešanja sa drugim proizvodima
Način delovanja	Odlična početna efikasnost i dugotrajnost
Visoka lipofilnost: brzo prodire u telo insekata i vezuje se za voštani sloj lišća	Brza efikasnost i dobra otpornost na kišu
Smanjena toksičnost prema korisnim insektima i dobra selektivnost prema oprašivačima	Lako se uključuje u programe integralne zaštite
Inhibira paukove grinje	
Stabilna formulacija otporna na delovanje visokih temperatura i sunčeve svetlosti	Na efikasnost ne utiču visoke temperature i intenzitet svetlosti



Pouzdana rešenje za odgovorno upravljanje glavnim štetočinama voćaka, povrtarskih i ratarskih useva. Formulirano sa UV zaštitom za maksimalne performanse pri nižim dozama. Odličan profil bezbednosti za životnu sredinu.

Usev	Štetočina	Maksimalan broj primene u sezoni	Broj primene	Karenca
Jabuka	Rutava buba (<i>Tropinota hirta</i>)	0,3 L/ha	2 aplikacije	OVP
Breskva	Breskvina lisna vaš (<i>Mysuz persicae</i>)	0,03 %	2 aplikacije	21 dan
Paprika	Breskvina lisna vaš (<i>Mysuz persicae</i>)	0,03 %	2 aplikacije	21 dan
Kupus, karfiol	<i>Pieris rapae</i> , <i>Plutella xylostella</i> , <i>Breviocoryne brassicae</i>	0,3 L/ha	2 aplikacije	7 dana
Pšenica	<i>Eurygaster maura</i> , <i>E. austriaca</i> , <i>Aelia</i> spp. <i>Oulema melanopus</i>	0,15 L/ha	2 aplikacije	28 dana
Uljana repica	Repičin sjajnik (<i>Meligethes aeneus</i>)	0,15-0,2 L/ha	2 aplikacije	56 dana

OVP - obezbeđeno vremenom primene

- **EVURE**® je stabilan i pod visokim temperaturama u poređenju sa drugim piretroidima
- **EVURE**® se lako meša sa većinom drugih sredstava za zaštitu bilja

Ovaj insekticid "voli masnije": brzo prodire u telo insekata i vezuje se za voštani sloj lišća i ima veoma dobru postojanost, sporo se ispira kišom

Na efikasnost preparata ne utiču visoke temperature i intenzitet sunčeve svetlosti

