



**Pravi izbor  
za mnogo  
problema!**



syngenta®

®




# Pravi izbor za mnogo problema!

## Aktivna materija:


19.4 g/kg metalaksil-m + 141.9 g/kg bakar iz bakar-oksida

**RIDOMIL® Gold R** je novi proizvod sa sistemičnim, kurativnim i kontaktnim delovanjem. **RIDOMIL® Gold R** je kombinacija sistemičnog metalaksila-m i kontaktnog bakarnog oksihlorida. Bakarni oksihlorid u proizvodu **RIDOMIL® Gold R** je u saglasnosti sa novim zakonskim propisima i tendencijama u Evropskoj uniji, pri čemu je dobijen proizvod visoke efikasnosti i kratke karence. Potpuno sistemično delovanje metalaksil-m i kontaktno delovanje bakarnog oksihlorida doprinose širokoj upotrebi u velikom broju useva, sa odličnim delovanjem kod najznačajnijih bolesti u svim uslovima.


Nakon brze apsorpcije mefenoksama (metalaksil-m) - u poređenju sa konkurentnim aktivnim materijama, 6 sati nakon aplikacije:



Fungicid 1



Fungicid 2



metalaksil-m



**RIDOMIL® Gold R** ima visoku efikasnost u suzbijanju uzročnika plamenjače i alternarije kod velikog dela povratarskih useva i vinove loze.

Brza apsorpcija i jako sistemično delovanje osiguravaju potpunu zaštitu, kako na tretiranim delovima, tako i na novom vegetativnom prirastu koji se razvija posle tretmana.

Kvalitet formulacije u proizvodu **RIDOMIL® Gold R** omogućava dug period upotrebe - odnosno period koji obuhvata skoro sve vreme gajenja useva.

**RIDOMIL® Gold R** sa svojom novom formulacijom karakteriše se vrhunskom učinkom, odličnim kontaktnim i sistemičnim delovanjem, produženim i sigurnim efektom od prvih do poslednjih tretmana.



Metalaksil-m sa visokim sistemičnim delovanjem štiti i prati novi prirast, koji se razvija nakon tretiranja



Aktivna materija se kreće prema vršnim delovima biljke i dospeva u nove delove biljke, nastale nakon tretiranja




# RIDOMIL® Gold R ima poboljšan kvalitet WG formulacije



## Prednosti


- Brzo usvajanje - bez opasnosti od ispiranja
- Kontaktno, translaminarno i visoko sistemično delovanje
- Producena zaštita
- Prati novi porast
- Jedinstven kurativni i siguran efekat
- Unapređena formulacija
- Jedinstvena formulacija bakarnog oksihlorida - doprinosi redukovanoj količini bakra u saglasnosti sa regulativom u EU
- Efikasan i stabilan u svim uslovima



# Gde i kada imamo najveću korist od RIDOMIL® Gold R?

## Upotreba u krompiru

Ridomil Gold R 5 kg/ha



mirovanje      prvi listovi počinju da rastu      razvoj 5-8 listova      početak formiranja krtola / početak cvetanja      cvetanje      precvetavanje / nalivanje krtola      vađenje krtola

## Upotreba u paradajzu

Ridomil Gold R 5 kg/ha



rasadivanje      7-10 dana po rasadivanju      razvijen 9 list      početak cvetanja      cvetanje / intezivan porast plodova      plodonošenje      završena berba



Plamenjača paradaja



Plamenjača na krompiru




Plamenjača na salati

## Upotreba **RIDOMIL® Gold R** u povrtarskim usevima

- **RIDOMIL® Gold R** ima široku primenu u mnogim povrtarskim usevima
- **RIDOMIL® Gold R** - ima široki opseg delovanja protiv najvažnijih bolesti - plamenjača i crna pegavost
- Pored delovanja na plamenjaču i crnu pegavost - bakarni element u **RIDOMIL® Gold R** deluje sporedno i na ostale bolesti
- Upotrebljava se od početka vegetacije sve do zrenja
- Na početku vegetacije prati rast i predstavlja sigurnu zaštitu u početnim fazama razvoja, kao preduslov zdravog nasada
- Predstavlja sigurni partner za zaštitu od plamenjače i crne pegavosti, u fazama kada dolazi do potpunog porasta biljaka odnosno u kasnijim fazama zbog kratke karence

### Praktične informacije

- Lak za upotrebu - brza rastvorljivost, ne stvara talog, nema stvaranja prašine
- Odlična selektivnost i delovanje u fazama u kojima se ostali kombinovani sistemični proizvodi sa bakrom ne upotrebljavaju
- Efikasno štiti novi prirast biljaka



## Upotreba u vinovoj lozi

Ridomil Gold R 5 kg/ha



kretanje  
vegetacije



lastari  
10-15 cm



lastari  
20-30 cm



cvetanje



precvetavanje



bobice veličine  
zrna pšenice



bobice veličine  
graška



zatvaranje  
grozda



početak  
sazrevanja  
(šarak)



bobice zrele  
za berbu

Ridomil Gold R 5 kg/ha

## Početak vegetacije

- Brzo prodiranje u listove i drške
- Potpuna zaštita novog prirasta - visoka sistematičnost prati sam prirast
- Dug period preventivne zaštite kao i 72 sata kurativnog delovanja - u slučaju zakasne aplikacije
- Optimalnoj količini bakra u saglasnosti sa regulativom u EU
- Širok spektar delovanja, pored odličnog delovanja na uzročnika plamenjače, preko kontaktne aktivne materije tako deluje na crnu pegavost i ostale bolesti

## U toku razvoja plodova

- Prati i štiti novi prirast, ukoliko dođe do povreda biljke uspešno sanira rane
- Kombinacija dve aktivne materije doprinosi da lastari kod vinove loze postanu otporniji na nepovoljne uslove
- Prati porast ploda
- Deluje odlično na kasne infekcije
- Preporučljiv i jedinstveni sistem na bazi bakra koji može da se upotrebljava u kasnijim fazama

Usev	Patogeni koje suzbija	Količina primene	Vreme primene	Karenca
<b>Vinova loza</b>	Plamenjača ( <i>Plasmopara viticola</i> )	5,0 kg/ha	Od pet razvijenih listova do početka šarka, odnosno po pojavi prvih simptoma (15-81 BBCH skale)	21 dan
<b>Paradajz, Krompir</b>	Plamenjača ( <i>Phytophthora infestans</i> ), crna peganost ( <i>Alternaria solani</i> )	5,0 kg/ha	Od razvijenog prvog pravog lista na glavnoj stabljici do smežuravanja bobica u prvoj cvasti (faze 11-89 BBCH skale), odnosno po pojavi prvih simptoma	Paradajz (3 dana) Krompir (14 dana)
<b>Salata, endivija</b>	Plamenjača ( <i>Bremia lactuceae</i> )	5,0 kg/ha	U uslovima povoljnim za pojavu i razvoj oboljenja	10 dana na otvorenom polju, 14 dana u zaštićenom prostoru
<b>Radič, motovilac</b>	Plamenjača ( <i>Bremia lactuceae</i> )	5,0 kg/ha	U uslovima povoljnim za pojavu i razvoj oboljenja	10 dana
<b>Karfiol, brokoli</b>	Plamenjača ( <i>Peronospora parasitica</i> )	5,0 kg/ha	U uslovima povoljnim za pojavu i razvoj oboljenja	21 dan
<b>Lubenica, dinja</b>	Plamenjača ( <i>Pseudoperonospora cubensis</i> )	5,0 kg/ha	U uslovima povoljnim za pojavu i razvoj oboljenja	3 dana
<b>Bosiljak i drugo začinsko bilje</b>	Plamenjača	5,0 kg/ha	U uslovima povoljnim za pojavu i razvoj oboljenja	28 dana u zaštićenom prostoru, 10 dana na otvorenom polju

## Najvažnije za RIDOMIL® Gold R

- Sistemični proizvod koji prati novi prirast.
- Kombinacija sistemičnog i kontaktnog delovanja kod velikog broja useva za najznačajnije bolesti.
- Jednovremeno delovanje kod povrtarskih useva za najznačajnije bolesti kao plamenjača, alternaria, kao i sporedno na ostale bolesti.
- Unapređena formulacija, kratka karenca, visoka efikasnost pri svim uslovima omogućava da RIDOMIL® Gold R ima dug period upotrebe - od početnih faza sve do berbe, u zavisnosti od useva.

- Visoka efikasnost je podržana i jakim kurativnim delovanjem, odnosno do 72 sati od infekcije.
- Jedinstveni kombinovani proizvod sa bakrom po najnovijim regulativama u EU koji može da se upotrebljava sve do završnih faza.
- Karenca od 3 do 20 dana u zavisnosti od useva.
- Idealan za preventivnu, kurativnu i sigurnu zaštitu pri kasnijim infekcijama.



**SYNGENTA AGRO d.o.o.**  
Airport City Belgrade  
Omladinskih brigada 88b  
11070 Novi Beograd  
tel: +381 11 3129981  
fax: +381 11 3129980  
[www.syngenta.rs](http://www.syngenta.rs)

Publikacija je informativnog karaktera i sve navedene karakteristike preporuke za zaštitu su rezultat našeg dosadašnjeg znanja, iskustva i dobre poljoprivredne prakse. Usled različitih karakteristika regiona, promenljivih vremenskih uslova, primenjene agrotehnike i zaštite useva tokom sezone, može doći do odstupanja od podataka objavljenih u ovoj brošuri. U tom slučaju Syngenta Agro d.o.o. ne preuzima odgovornost za nastale promene. Pre upotrebe sredstava za zaštitu bilja obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu. Za sve dodatne informacije stručna služba Syngenta Agro stoji Vam na raspolaganju.